



SKÅNES LUFTVÅRDSFÖRBUND

# Årsrapport för Östra Göinge 2023



**Författare:** Victor Andréasson  
**Avdelning:** Miljöstrategiska avdelningen  
**Datum:** 2024-10-04  
**Diarienummer:** MN-2024-5170  
**Förvaltning:** Miljöförvaltningen, Malmö stad  
**Foto:** Victor Andréasson, sida 1.

# Förord

---

Östra Göinge är en del av det skånska luftvårdsförbundet där en samordnad kontroll av luftföroreningar ingår i medlemskapet för kommuner. I den samordnade kontrollen ingår utomhusmätningar samt beräkningar av luftföroreningar, som sammanställs i den här rapporten.

Rapporten är sammanställd av Victor Andréasson, enheten för miljöövervakning och analys på miljöstrategiska avdelning, Malmö stad.

# Innehåll

---

<b>Förord</b>	<b>3</b>
<b>Sammanfattning</b>	<b>5</b>
<b>1. Inledning</b>	<b>6</b>
<b>2. Resultat</b>	<b>8</b>
2.1 Kvävedioxid	8
2.2 Svaveldioxid	10
2.3 Partiklar – PM 10 & PM 2.5	12
2.3.1 Partiklar – PM 10	12
2.3.2 Partiklar – PM 2.5	14
2.4 Tungmetaller och PAH	17
2.5 Tungmetaller	17
2.6 Bens(a)pyren	20
2.7 Kolmonoxid	21
2.8 Bensen	21
<b>3. Referenser</b>	<b>24</b>

# Sammanfattning

---

Samtliga kommuner i Sverige har skyldighet att kontrollera och ha kunskap om kommunens utomhusluftkvalitet enligt Luftkvalitetsförordningen (2010:477), detta för att förhindra eller minimera antalet sjukdoms- och dödsfall som kommer till följd av luftföroreningar varje år. Till hjälp så finns WHO:s riktlinjer, de svenska miljömålen samt de lagstadgade miljökvalitetsnormerna (MKN). I tabell 1 finns samtliga övervakade ämnen i Skåne samt MKN, riktvärden från WHO och miljömålen samt kommunens högst uppmätta eller uträknade halt.

I Östra Göinge är det bland annat värt att notera:

- Samtliga årsmedelvärden för luftföroreningar ligger under MKN.
- För den svenska miljömålen klarar sig Östra Göinge för alla ämnen, endast partiklar mindre än 2,5 µm (PM 2.5) tangerar här miljömålen.
- WHO:s riktvärden klarar kommunen för alla ämnen förutom för PM 2.5.

Tabell 1. Visar luftkvaliteten i Östra Göinge tillsammans med miljökvalitetsnormerna för olika luftföroreningar och riktlinjerna från WHO och de svenska miljömålen.

Ämne	MKN	Miljömålen	WHO	Årsmedelvärde
Kvävedioxid (µg/m <sup>3</sup> )	40	20	10	5
Svaveldioxid (µg/m <sup>3</sup> )	20	-	-	0,5
PM 10 (µg/m <sup>3</sup> )	40	15	15	14
PM 2.5 (µg/m <sup>3</sup> )	25	10	5	10
Bensen (µg/m <sup>3</sup> )	5	1	-	0,5
Bens(a)pyren (ng/m <sup>3</sup> )	1	0,1	-	0,4
Arsenik (ng/m <sup>3</sup> )	6	-	-	0,3
Bly (ng/m <sup>3</sup> )	500	-	-	1,6
Kadmium (ng/m <sup>3</sup> )	5	-	-	0,05
Nickel (ng/m <sup>3</sup> )	20	-	-	0,7


# 1. Inledning

---

Varje år blir människor sjuka eller dör till följd av luftföroreningar världen över. För att minska luftföroreningarna i Sverige så finns flera initiativ för att förbättra luftkvaliteten. Framst för Sverige finns Luftkvalitetsförordningen som reglerar vilka maxhalter av olika luftburna föroreningar och partiklar befolkningen i Sverige får exponeras för, detta regleras via miljökvalitetsnormerna (MKN) (tabell 1). Världshälsoorganisationen (WHO) har rekommendationer på vilka halter som ej bör överskridas som är mer strikta än MKN. I FN:s Agenda 2030, berörs luftkvaliteten i två av målen. Delmål 3.9: ”Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och föroreningar” och delmål 11.6: ”Minska städers miljöpåverkan”. Som en spegling av FN:s Agenda 2030 finns även Sveriges miljömål, med sina riktvärden. Och sist så finns även EU:s luftkvalitets direktiv, som kommer att få nya skärpta riktlinjer då det sätts nya mål om att helt eliminera luftföroreningar till år 2050.

Kommuner är skyldiga att övervaka luftkvaliteten så att insatser kan göras där det behövs. Om halterna skulle vara över MKN så krävs att kommunen upprättar åtgärdsprogram för att minska luftföroreningarna som invånarna exponeras för. Östra Göinge är en del av ett större samverkansområde där totalt 33 kommuner i Skåne samarbetar med övervakningen av luftföroreningar. I Skåne så utförs kontinuerliga mätningar av luftkvaliteten på tio platser i länet (Figur 1), Fyra stationer mäter i gatumiljö, två mäter urbanbakgrund och fyra stationer mäter den regionala bakgrundshalten där halterna i Skåne är som lägst. Utöver detta görs olika beräkningar baserade på utsläppsdata och mätningarna för att beskriva hela Skånes luftföroreningssituation.

## Mätstationer i Skåne




Figur 1. En karta över mätpunkterna i Skåne.

## 2. Resultat

### 2.1 Kvävedioxid


Kvävedioxid ( $\text{NO}_2$ ) är en gas som bildas vid förbränning av fossila bränslen. Den är viktig att mäta då den har flera negativa hälsoeffekter och dessutom är en viktig byggsten för att ozon ska bildas, vilket inte är bra när det sker i troposfären som är den nedre delen av atmosfären där vi vistas. Det är detta som kallas marknära ozon som orsakar flera dödsfall årligen vid högre koncentrationer samt har effekter på vegetation där det finns kopplingar till lägre skördar vid högre koncentrationer av ozon.

I Östra Göinge har tre mätningar gjorts sedan 2009 av  $\text{NO}_2$ . I grafen nedan (figur 2) visas tre mätvärden som är gjorda i gatumiljö längs med Tydingegatan i Broby, samt en extrapolerad trend över hur utvecklingen bör ha sett ut. Värdena landar då runt  $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$  för år 2023 och är med god marginal under MKN på  $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$  och klarar dessutom WHO:s riktvärde på  $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Detta bekräftas också av den modellerade kartbilden (figur 3) där de högsta halterna ligger mellan  $4 - 5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .



Figur 2. Visar hur koncentrationen av  $\text{NO}_2$  i atmosfären har förändrats från år 2009 – 2023. Jämfört med Malmö och bakgrundsmätningar Hyltemossa. Samt en extrapolerad trend baserat på de mätningar som gjorts i kommunen.






Figur 3. Karta som visar årsmedelvärden av NO<sub>2</sub> för år 2020 i Östra Göinge kommun.

I figur 4 visas beräknade värden från SMHI av utsläppskällor till kväveoxider (NO<sub>x</sub>) i kommunen, vilket inkluderar NO<sub>2</sub>. Utsläppen minskar från ca 200 ton år 2015 till ca 150 ton år 2022. De flesta utsläppen kommer från transporter samt jordbruk.

## NO<sub>x</sub> utsläppskällor - Östra Göinge




Figur 4. Visar utsläppskällorna av NO<sub>x</sub> för Östra Göinge, beräknat värde från SMHI.

### 2.2 Svaveldioxid

Svaveldioxid (SO<sub>2</sub>) bildas framför allt vid förbränning av fossila bränslen och har länge varit en av de luftföroreningar som det finns mest av världen över. Svaveldioxid har kopplats samman med flera hälsoeffekter så som luftvägssjukdomar, bland annat finns ett samband mellan förhöjda halter av svaveldioxid och antalet astmapatienter som skrivs in på sjukhus.

I Östra Göinge har inga mätkampanjer av SO<sub>2</sub> gjorts, istället har ett värde räknats fram baserat på kringliggande kommuner för 2023 på ca 0,5 µg/m<sup>3</sup>. Felmarginalen i beräkningen är hög men beräkningen ger en indikation på hur halten ser ut. MKN på 20 µg/m<sup>3</sup> klarar Östra Göinge med god marginal.


Kartan i figur 5 visar modellerade värden från 2019 över kommunen, generellt ligger värdena mellan 0,3 – 0,4 µg/m<sup>3</sup> på landsbygden och mellan 0,5 – 0,6 µg/m<sup>3</sup> i tätorterna.



Figur 6. Karta som visar årsmedelvärdet av SO<sub>x</sub> för år 2019 i Östra Göinge.

I figur 6 visas beräknade värden från SMHI av utsläppskällor till kväveoxider (SO<sub>x</sub>) i kommunen, vilket inkluderar SO<sub>2</sub>. Utsläppen varierar mellan 5 – 8 ton/år och de mesta utsläppen kommer från el och värme, avfall samt något bidrag från industrin år 2022.

## SO<sub>x</sub> utsläppskällor - Östra Göinge




Figur 6. Visar utsläppskällorna av SO<sub>x</sub> för Östra Göinge, beräknat värde från SMHI.

## 2.3 Partiklar – PM 10 & PM 2.5

Partiklar (PM) är aerosoler som finns i luften runt omkring oss, de mäts oftast i två storlekar PM 10 och PM 2.5, som är partiklar med en diameter på mindre än 10 mikrometer respektive 2,5 mikrometer. Dessa små partiklar orsakar även de sjukdomsfall och dödsfall årligen. Aerosoler skapas av ett flertal orsaker: En del skapas vid förbränning, andra vid friktion eller turbulens, till exempel när ett fordon kör på en väg eller räls, eller bromsar. Vind kan även de röra upp partiklar från marken som kan vara kvar i luften under lång tid. Detta gör att många aerosoler, speciellt de med liten massa dvs både PM10 och PM2.5 kan färdas långa sträckor, exempelvis så landar varje år ett par ton sand i Sverige som har transporterats från norra Sahara.


### 2.3.1 Partiklar – PM 10

I Östra Göinge har inga mätningar av PM 10 gjorts, istället har en skattningsberäkning gjorts som baseras på kringliggande kommuner (Figur 8), med ett årsmedelvärde på 14  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ . Värdet har en stor felmarginal men ger ändå en indikation på hur halterna i kommunen ser ut. Och med den beräknade halten är kommunen långt under MKN och är precis under de svenska miljömålen och WHO:s riktlinjer. I den modellerade kartbilden i figur 9 visar koncentrationen i olika delar av kommunen, värdena är runt 13–14  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  i hela kommunen med något högre värden i tätorterna där värdena ligger runt 14–15  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .



Figur 7. Visar hur koncentrationen av PM10 har förändrats för år 2012 – 2023.


## Östra Göinge – Årsmedelvärde för PM10 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) år 2021



Figur 8. Karta som visar årsmedelvärdet av PM10 för år 2021 i Östra Göinge.

I figur 9 så visas beräknade värden från SMHI av utsläppskällor till PM10 i kommunen. Utsläppen ligger på ungefär samma nivå genom den beräknade perioden mellan 80 – 90 ton/år, där de flesta utsläppen kommer från industrin.


## PM10 utsläppskällor - Östra Göinge



Figur 9. Visar utsläppskällorna av PM10 för Östra Göinge, beräknat värde från SMHI.


### 2.3.2 Partiklar – PM 2.5

Även för PM2.5 så finns endast en beräknad trend i Östra Göinge. Även här med en stor felmarginal. Den beräknade halten slutar på  $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , vilket är under MKN på  $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , tangerar de svenska miljömålen på  $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$  men klarar inte WHO:s riktlinjer på  $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . I den modellerade kartbilden visas halter något lägre än den beräknade halten, runt  $7 - 8 \mu\text{g}/\text{m}^3$  inne i tätorten och runt  $4 - 5 \mu\text{g}/\text{m}^3$  på landsbygden.



Figur 10. Visar hur koncentrationen av PM2.5 har förändrats för år 2015 – 2023.

## Östra Göinge – Årsmedelvärde för PM2,5 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) år 2022




Figur 11. Karta som visar årsmedelvärdet av PM2.5 för år 2022 i Östra Göinge.

I figur 12 så visas beräknade värden från SMHI av utsläppskällor till PM2.5 i kommunen. Utsläppen ligger mellan 25 – 30 ton/år där den största delen av utsläppen kommer från el och värme.



## PM2.5 utsläppskällor - Östra Göinge



Figur 12. Visar utsläppskällorna av PM2.5 för Östra Göinge, beräknat värde från SMHI.

### 2.4 Tungmetaller och PAH


Både PAH och tungmetaller kommer ut i luften vid förbränning och har flera allvarliga hälsoeffekter vid inandning. Flera av de är cancerframkallande, många PAH skapar även skada på arvs massa eller ger upphov till luftvägssjukdomar. Samt flertalet andra effekter beroende på vilket ämne det handlar om.

### 2.5 Tungmetaller

Under 2023 mättes koncentrationen av fyra metaller i luften i flera kommuner i Skåne. Mätningarna har utförts i de kommuner som har de högst estimerade halterna i länet. Viktigt att komma ihåg är dock att det inte finns någon nedre gräns för när dessa ämnen slutar vara hälsofarliga, även låga koncentrationer utgör ett hot för hälsan.


Nedfall av metaller har ej mätts i Östra Göinge, istället har en skattningsberäkning utförts som baseras på mätkampanj från både 2018 och 2023 och halter i närliggande kommuner. Detta innebär att det finns en stor felmarginal i de beräknade värdena. Dock så ger de fortfarande en uppskattning på halterna i kommunen för att kontrollera att MKN ej överskrids. För arsenik hamnar Östra Göinge på  $0,3 \text{ ng/m}^3$ , för bly  $1,6 \text{ ng/m}^3$ ,  $0,05 \text{ ng/m}^3$  för kadmium och  $0,7 \text{ ng/m}^3$  för nickel. Det innebär att samtliga ligger långt under MKN (se tabell 1).

## Arsenik - 2023




Figur 13. Visar hur medelkoncentrationen av arsenik i atmosfären såg ut i åtta kommuner och två bakgrundstationer under en tremånaders mätkampanj i 2023.

## Bly - 2023




Figur 14. Visar hur medelkoncentrationen av bly i atmosfären såg ut i åtta kommuner och två bakgrundstationer under en tremånaders mätkampanj i 2023.

## Kadmium - 2023



Figur 15. Visar hur medelkoncentrationen av kadmium i atmosfären såg ut i åtta kommuner och två bakgrundstationer under en tremånaders mätkampanj i 2023.

## Nickel - 2023




Figur 16. Visar hur medelkoncentrationen av nickel i atmosfären såg ut i åtta kommuner och två bakgrundstationer under en tremånaders mätkampanj i 2023.

## 2.6 Bens(a)pyren

Bens(a)pyren är en PAH som släpps ut i luften från bland annat vedeldning, trafik eller andra arbetsmaskiner. I den här rapporten används bens(a)pyren som en indikator för PAH.


Bens(a)pyren i Östra Göinge ligger mellan 0,04 och 0,05 ng/m<sup>3</sup> (figur 17), precis som för metaller så är detta ett skattat värde baserat på närliggande kommuner. Vilket innebär att även för bens(a)pyren så är felmarginalen stor. De slutsatser som det trots det går att dra är att halterna i Östra Göinge ligger långt under både MKN och de svenska miljömålen som ligger på 1 respektive 0,1 ng/m<sup>3</sup>.



Figur 17. Visar hur medelkoncentrationen av bens(a)pyren i atmosfären såg ut i elva kommuner, två bakgrundstationer samt ett skattat värde för Östra Göinge i Skåne under en tremånaders mätkampanj i 2023.

I figur 19 så visas beräknade värden från SMHI av utsläppskällor till i kommunen. Här är det el och värme som släpper ut nästan 100% av PAH i Östra Göinges kommun, vilket kan förklaras av vedeldning som en stor källa.

## PAH utsläppskällor - Östra Göinge



Figur 18. Visar utsläppskällorna av PAH för Östra Göinge, vilket inkluderar bens(a)pyren. beräknat värde från SMHI.

### 2.7 Kolmonoxid

Kolmonoxid skapas vid ofullständig förbränning, varav den största utsläppskällan är från fordon med förbränningsmotorer, det skapas även vid andra typer av förbränning till exempel inom industri och energiproduktion eller vid eldning i en brasa eller öppen spis. De senaste årtionden har halterna kolmonoxid minskat i atmosfären, detta till följd av implementeringen av katalysatorer i fordon.


Kolmonoxid kan ha mycket allvarliga hälsoeffekter, då det via lungorna kommer in i blodet och minskar blodets syreupptagningsförmåga. Detta skapar effekter så som andningssvårigheter, yrsel eller i värsta fall dödsfall.

Kolmonoxid mäts endast i Malmö som har de högsta halterna av luftföroreningar i Skåne, även i Malmö är halterna så pass låga att de ej bedöms ha någon betydande påverkan på invånarnas hälsa, år 2023 låg halten i Malmö på 2,5 mg/m<sup>3</sup> det riktvärde som finns är satt efter ett åtta timmars glidande medelvärde och får ej överskrida 10 mg/m<sup>3</sup>. Därav utförs varken fler mätningar eller beräkningar i övriga Skåne som troligen ligger långt under halterna i Malmö.

### 2.8 Bensen

Bensen är ett ämne som även det släpps ut i luften via all typ av förbränning, från motorfordon till vedeldning. En annan stor exponeringskälla är cigarettrök där människor exponeras även vid passiv rökning. Bensen har allvarliga hälsoeffekter då det är cancerframkallande och ger upphov till både leukemi och lungcancer. MKN för bensen har inte överskridits de senaste åren, dock så finns det ingen nedre gräns där det med säkerhet kan konstateras att inga negativa hälsoeffekter på människor


uppstår. I samverkansområdet så mäts bensen kontinuerligt i Malmö, som bedöms ha de högsta halterna. Sedan har det skett två mätkampanjer i samverkansområdets kommuner. Östra Göinge var med i båda mätkampanjerna och uppmätte 0,63  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  år 2017 och 0,62  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  år 2022, den estimerade trenden får en halt på 0,5  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  år 2023. Vilket klarar både MKN på 5  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  och de svenska miljömålen på 1  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .



Figur 19. Visar hur koncentrationen av bensen i atmosfären har förändrats för år 2015 – 2023 i Östra Göinge jämfört med Malmö.

Bensen är en del av en större grupp av ämnen så kallade flyktiga organiska ämnen (VOC). Då SMHI ej beräknar specifikt bensen så visar figur 20 istället de samlade utsläppen av VOC. VOC släpps främst ut från industrin, samt produktanvändning. I kategorin produktanvändning kommer utsläppen främst från användning av färg och lösningsmedel.

## VOC utsläppskällor - Östra Göinge



Figur 20. Visar utsläppskällorna av VOC för Östra Göinge, beräknat värde från SMHI.

## 3. Referenser

---

Luftkvalitetsförordningen. (SFS 2010:477).

Naturvårdsverket (2007). Flyktiga organiska ämnen (VOC).

Naturvårdsverket (2024). Fakta om kolmonoxid i luft. [Fakta om kolmonoxid i luft \(naturvardsverket.se\)](https://naturvardsverket.se). Hämtad den 15 april 2024.

Naturvårdsverket (2024). Fakta om metaller i luft. [Fakta om metaller i luft \(naturvardsverket.se\)](https://naturvardsverket.se). Hämtad den 15 april 2024.

Regeringskansliet (Inget datum). Agenda 2030 för hållbar utveckling. <https://www.regeringen.se/regerings-politik/globala-malen-och-agenda-2030/> Hämtad den 12 mars 2024.

Skånes Luftvårdsförbund (Inget datum). Samordnad luftkvalitetskontroll i Skåne. [Samordnad luftkontroll — Skånes Luftvårdsförbund \(xn--skneluft-b0a.se\)](https://xn--skneluft-b0a.se). Hämtad den 24 april 2024.

SMHI (inget datum). Nationella emissionsdatabasen. [Nationella emissionsdatabasen \(smhi.se\)](https://smhi.se) Hämtad den 15 april 2024

World health organization (2019). Exposure to benzene: A major public health concern.

World Health organization (2021). Human health effects of polycyclic aromatic hydrocarbons as ambient air pollutants.

World Health Organization (2021). WHO global air quality guidelines.

World Health Organization (inget datum). [Air quality, energy and health \(who.int\)](https://who.int). Hämtad den 15 april 2024.

European Parliament (2024). Air pollution: deal with council to improve air pollution. [Air pollution: Deal with Council to improve air quality | News | European Parliament \(europa.eu\)](https://europa.eu). Hämtad den 3 maj 2024.